

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Гавискон Ликвид Сашета 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml + 160 mg/10 ml

Перорална суспензия

Натриев алгинат/Натриев хидроген карбонат/Калциев карбонат

Gaviscon Liquid Sachets 500 mg /10 ml + 267 mg /10 ml + 160 mg /10 ml Oral suspension

Sodium alginate/Sodium hydrogen carbonate/Calcium carbonate

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 7 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Гавискон Ликвид Сашета и за какво се използва
 2. Преди да приемате Гавискон Ликвид Сашета
 3. Как да приемате Гавискон Ликвид Сашета
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Гавискон Ликвид Сашета
 6. Допълнителна информация
1. **КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГАВИСКОН ЛИКВИД САШЕТА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Всестранно Приложение 2	
Към Рег. №	20100276
Разрешение №	П - 9307 / 15. 04. 2010
Одобрение №	/

Гавискон Ликвид Сашета спада към група лекарства, наречени „супресори на рефлукса“, които образуват защитен слой по повърхността на стомашното съдържимо, за да възпрепятстват изтичането на стомашна киселина от стомаха към хранопровода, където причинява болка и дискомфорт.

Този лекарствен продукт се използва за лечение на симптоми на гастро-езофагеален рефлукс, като киселинна регургитация, киселини от стомаха и нарушено храносмилане, свързани с рефлукса, например след хранене или по време на бременност, или при пациенти със симптоми свързани с рефлукс езофagit.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ГАВИСКОН ЛИКВИД САШЕТА

Не приемайте Гавискон Ликвид Сашета

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към някоя от съставките на Гавискон Ликвид Сашета, тъй като много рядко в възможно да се появят затруднено дишане и кожни обриви (виж информацията по-долу за пълния списък на нежелани реакции) .

Обърнете специално внимание при употреба на Гавискон Ликвид Сашета

Този лекарствен продукт съдържа малки количества натрий (6.2 mmol на 10 ml) и калций (1.6 mmol на 10 ml).

- ако сте посъветвани да спазвате строга ограничителна диета по отношение на тези вещества, моля консултирайте се с Вашия лекар.
- Ако страдате от сериозно бъбречни или сърдечно заболяване, посъветвайте се с Вашия

лекар, тъй като някои соли могат да повлияят на тези заболявания.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако Ви е известно че имате понижени нива на солна киселина в стомаха, тъй като ефективността на този лекарствен продукт в тези случаи може да е намалена.

Ако симптомите не се подобрят до седем дни, консултирайте се с Вашия лекар.

Прием на други лекарства

Не приемайте този лекарствен продукт в рамките на 2 часа от приема на други лекарствени продукти през устата, тъй като може да повлияе действието на другите лекарствени продукти.

Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност и кърмене.

Важна информация относно някои от съставките на Гавискон Ликвид Сашета

Този лекарствен продукт съдържа метил (E218) и пропил (E216) парахидроксибензоат, които могат да причинят алергични реакции (възможно с късна поява).

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ГАВИСКОН ЛИКВИД САШЕТА

За перорална употреба.

Възрастни, включително в старческа възраст и деца над 12-годишна възраст: Едно до две сашета след хранене и преди сън, или според указанията на лекаря (до четири пъти дневно).

Деца под 12-годишна възраст: Прилага се само по лекарско предписание.

Ако сте приели повече от необходимата доза Гавискон Ликвид Сашета

Ако сте приели по-голямо количество от лекарствения продукт, малко е вероятно това да Ви навреди. Въпреки това е възможно да почувствате подуване на корема. Ако оплакването не премине, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали прием на Гавискон

Ако пропуснете приема на една доза, не приемайте двойна доза следващия път, а продължете обичайния прием на лекарствения продукт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Гавискон Ликвид Сашета може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Ако се появят някои от следните нежелани реакции, преустановете приема на лекарството и се посъветвайте с Вашия лекар възможно по-скоро. Много рядко (по-малко от 1 на 10 000) може да се наблюдават алергични реакции към помощните вещества. Симптомите включват кожни обриви, сърбеж, затруднено дишане, замаяност или отоци на лицето, устните, езика или гърлото.

Ако някоя от тези нежелани реакции стане сериозна или ако забележите реакции неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ГАВИСКОН ЛИКВИД САШЕТА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Гавискон Ликвид Сашета след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Съхранявайте го при температура под 25°C, в оригиналната опаковка.
Да не се замразява или съхранява в хладилник.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Гавискон Ликвид Сашета

Активните вещества във всяко саше (10 ml перорална суспензия) са: 500 mg натриев алгинат, 267 mg натриев хидроген карбонат и 160 mg калциев карбонат.

Другите съставки са: карбомер, метил парахидроксibenзоат (E218), пропил парахидроксibenзоат (E216), захарин-натрий, естествен аромат на мента, натриев хидроксид, пречистена вода.

Този лекарствен продукт не съдържа захар и оцветители.

Как изглежда Гавискон Ликвид Сашета и какво съдържа опаковката

Лекарственият продукт Гавискон Ликвид Сашета представлява почти бяла суспензия с мирис и вкус на мента.

Гавискон Ликвид Сашета се предлагат в опаковки от: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 36 сашета.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Великобритания

Производител

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Великобритания

Този лекарствен продукт е разрешен в страните членки на ЕЕА под слените имена:
UK Gaviscon Liquid Sachets

Дата на последното одобряване на листовката: март, 2010

