

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

МАКСИТРОЛ 1mg/g+ 3500 IU/g+ 6000 IU/g, маз за очи
(MAXITROL 1mg/g+ 3500 IU/g+ 6000 IU/g, eye ointment)

Дексаметазон/Неомицин сулфат/Полимиксин Б
(Dexamethasone/Neomycin sulphate/Polymyxin B)

3600055
15-510, 27.10.2011

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го преотстъпвате на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт

В тази листовка:

1. Какво представлява МАКСИТРОЛ маз за очи и за какво се използва
2. Преди да използвате МАКСИТРОЛ маз за очи
3. Как да използвате МАКСИТРОЛ маз за очи
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате МАКСИТРОЛ маз за очи
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАКСИТРОЛ МАЗ ЗА ОЧИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

МАКСИТРОЛ е кортикостероидна-противовъзпалителна комбинация.

Кортикостероидите (дексаметазон в този случай) предотвратяват или намаляват възпалението в окото. Противовъзпалителните вещества (неомицин сулфат и полимиксин Б сулфат в този случай) са ефективни срещу най-често срещаните микроорганизми, които могат да инфектират окото(очите).

МАКСИТРОЛ се използва за лечение на възпаление и вероятна инфекция на Вашето око(очи). Това възпаление може да е причинено от инфекция или от попадане на чуждо тяло, или от нараняване на окото.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАКСИТРОЛ МАЗ ЗА ОЧИ

Не използвайте МАКСИТРОЛ маз за очи:

- ако сте алергични към неомицин сулфат, полимиксин Б сулфат и/или дексаметазон или към някоя от останалите съставки на МАКСИТРОЛ маз за очи.
- ако се съмнявате, че имате:
 - епителен херпес симплекс кератит, едра шарка(вариола), варицела или друга вирусна инфекция на окото
 - гъбични инфекции на окото
 - туберкулоза на окото



Обърнете специално внимание при употребата на МАКСИТРОЛ маз за очи:

- Използвайте МАКСИТРОЛ маз за очи само за Вашите очи.
- Ако получавате алергични реакции като сърбеж в областта на клепача, подуване или зачервяване на окото, преустановете употребата на лекарствения продукт и се консултирайте с Вашия лекар.
- Употребата на това лекарство може да причини зачервяване на кожата, дразнене и дискомфорт.
- Може да настъпи алергична чувствителност при употребата на други аминогликозидни антибиотици за локално или системно приложение.
- Попитайте Вашия лекар за съвет ако използвате друго антибиотично лечение заедно с МАКСИТРОЛ маз за очи.
- Ако използвате МАКСИТРОЛ маз за очи продължително време, Вие може да:
 - имате повишено налягане във Вашето око/очи. Вие трябва редовно да проверявате вътреочното налягане докато използвате МАКСИТРОЛ маз за очи. Посъветвайте се с Вашия лекар за това.
 - развиете катаракта (замъгляване на естествената леща на окото, т.нар. перде)
 - станете по-податливи към очни инфекции.
- Ако симптомите Ви се влошават или внезапно възобновят, моля свържете се с Вашия лекар.
- Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт ако преди да използвате този лекарствен продукт сте имали нарушения, причиняващи изтъняване на очните тъкани.
- Ако носите контактни лещи:
 - Носенето на контактни лещи (твърди или меки) не се препоръчва по време на лечението на очно възпаление или инфекция.
- **ако имате високо вътреочно налягане (глаукома).** Обърнете се към Вашия лекар за съвет.

Важна информация за някои от съставките на MAXITROL:

Лекарственият продукт съдържа метил-парахидроксибензоат и пропил-парахидроксибензоат (като консерванти), за които е известно, че могат да причинят уртикария.

Възможно е Вашият лекар да поиска да провери налягането във Вашето око(очи) по време на лечение с този лекарствен продукт. Следвайте неговите съвети.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте приемали някакъв друг лекарствен продукт. Не забравяйте също така да споменете и лекарствата, които сте закупили без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на който и да е лекарство. МАКСИТРОЛ маз за очи не трябва да се използва по време на бременност или кърмене.

Шофиране и работа с машини

Възможно е непосредствено след поставянето на МАКСИТРОЛ маз за очи да се появи краткотрайно замъгляване на зрението. Вие трябва да изчакате докато зрението Ви се проясни и едва тогава да шофирате или да работите с машини.

Важна информация относно някои от съставките на МАКСИТРОЛ маз за очи

Ако носите контактни лещи:

- отстранете ги непосредствено преди да използвате МАКСИТРОЛ маз за очи и изчакайте поне 15 минути преди да поставите лещите обратно. Носенето на контактни лещи не се препоръчва по време на лечение на инфекция/възпаление на окото.



- МАКСИТРОЛ маз за очи съдържа метил-парахидроксибензоат и пропил-парахидроксибензоат, за които е известно, че могат да причинят алергични реакции (възможно е да се проявят по-късно); и ланолин, който може да причини локални кожни реакции (контактен дерматит).

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАКСИТРОЛ МАЗ ЗА ОЧИ

Винаги използвайте МАКСИТРОЛ маз за очи точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Използвайте МАКСИТРОЛ маз за очи **само** за вашите очи.

Обичайната доза е малко количество (лентичка с дължина приблизително 1,5 cm) в конюнктивния сак на засегнатото око(очи), три до четири пъти дневно. Продължителността на лечението е по преценка на Вашия лекар.


Безопасността и ефективността на МАКСИТРОЛ маз за очи при педиатрични пациенти не е изследвана, затова употребата при деца не се препоръчва.

ОБЪРНЕТЕ СТРАНИЦАТА ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Обърнете сега>



3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАКСИТРОЛ МАЗ ЗА ОЧИ (продължение)



< фигура 1 >



< фигура 2 >

Колко да поставите
<виж страна 1

1. Вземете тубата МАКСИТРОЛ маз за очи и огледало.
2. Измийте ръцете си.
3. Отвъртете капачката.
4. Дръжте тубата между палеца и показалеца.
5. Наклонете главата назад. Разтворете клепача, с почистения вече пръст, така че да се образува 'джоб' между него и окото. Лентичката маз трябва да попадне именно на това място (фигура 1).
6. Приближете накрайника на тубата близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.
7. **Не докосвайте окото, клепача, заобикалящата ги площ или други повърхности с накрайника.** Това може да замърси лекарствения продукт.
8. Внимателно стиснете тубата, за да изпусне лентичка от МАКСИТРОЛ маз за очи (фигура 2).
9. След като поставите МАКСИТРОЛ маз за очи, пуснете клепача, мигнете няколко пъти, за да е сигурно, че лекарственият продукт е покрил цялата повърхност на окото. Внимателно затворете окото(очите) за няколко секунди; това е необходимо, за да попречите МАКСИТРОЛ да премине към другите части на тялото.
10. Ако е необходимо да поставите МАКСИТРОЛ маз за очи и в двете очи, повторете всички предходни стъпки и за другото око.
11. Затворете добре тубата веднага след употреба.
12. Използвайте само една и съща туба.

Ако МАКСИТРОЛ маз за очи не попадне в окото, опитайте отново.

Ако сте пропуснали да поставите МАКСИТРОЛ маз за очи, продължете със следващата доза по Вашата обичайна схема. Ако обаче вече е време за следващата Ви доза, прескочете пропуснатата и се върнете към Вашата обичайна схема на дозиране . **Не поставяйте двойна доза,** за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте поставили повече от необходимото количество МАКСИТРОЛ маз за очи, изплакнете окото(очите) с хладка вода. Не поставяйте повече от мазта докато не дойде време за следващата обичайна доза.

Ако използвате и други лекарствени продукти за очи, изчакайте 5 минути между поставянето на всяко едно от тях. Мазта за очи трябва да бъде поставена последна. **Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт,** моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарствени продукти, МАКСИТРОЛ маз за очи може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки, че не всеки го получава. Следните нежелани реакции са наблюдавани при МАКСИТРОЛ маз за очи:

Нечести нежелани реакции (засягат 1 до 10 потребители на 1 000):

- **Ефекти в окото:** възпаление на очната повърхност, повишено вътреочно налягане, замъглено зрение, чувствителност към светлина, увеличен размер на зеницата, падане на клепача, болка в окото, подуване на окото, сърбеж в окото, очен дискомфорт, анормално усещане в окото, дразнене в окото, увеличено слъзоотделяне, подуване на клепача, сърбежа на клепача, очна алергия, зачервяване.
- **Общи ефекти:** алергия

Обикновено, Вие можете да продължите употребата на лекарствения продукт, освен ако реакциите не са сериозни. Ако нещо Ви притеснява, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МАКСИТРОЛ МАЗ ЗА ОЧИ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте МАКСИТРОЛ маз за очи след срока на годност, обявен върху тубата и картонената кутия (отбелязан като 'Годен до'). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°C. Да не се замразява.

Тубата трябва да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне, за да бъдат избегнати евентуални инфекции.

Да се съхранява в плътно затворена опаковка.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа МАКСИТРОЛ маз за очи

Активните вещества са: дексаметазон, неомицин сулфат и полимиксин Б сулфат. Един грам от мазта съдържа 1 mg дексаметазон, 3 500 I.U. неомицин сулфат и 6 000 I.U. полимиксин Б сулфат.

Другите съставки са: метил-парахидроксибензоат (E218), пропил-парахидроксибензоат (E216), безводен течен ланолин и бял вазелин.

Как изглежда МАКСИТРОЛ маз за очи и какво съдържа опаковката



МАКСИТРОЛ е мазна, прозрачна до непрозрачна и бяла до бледо жълта хомогенна маз за очи, без бучки, която се доставя в опаковка, съдържаща туба от 3,5 g с пластмасов накрайник и пластмасова капачка.

Притежател на разрешението за употреба

Алкон България ЕООД
ул. "Д.Манов"10
София 1408
България

Производител

S.A. Alcon - Couvreur N.V
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Белгия

Производител

Alcon Cusí, S.A
Camil Fabra 58
08320 El Masnou
Испания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

България

Алкон България ЕООД
☎ + 359 2 950 15 65

Дата на последно одобрение на листовката: XX/XXXX.

