

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**Метопролол тартарат Акорд 50 mg таблетки****Метопролол тартарат Акорд 100 mg таблетки****Метопрололов тартарат****Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Метопролол тартарат Акорд и за какво се използва
2. Преди да приемете Метопролол тартарат Акорд
3. Как да приемате Метопролол тартарат Акорд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Метопролол тартарат Акорд
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Метопролол тартарат Акорд и за какво се използва

Активното вещество, метопролол тартарат, принадлежи към група лекарства, наречени бета-блокери.

Метопролол тартарат оказва ефект върху това как работи сърцето и понижава кръвното налягане. Метопролол тартарат може да се използва за лечение на редица състояния. Може да се предписва на пациенти за:

- понижаване на високо кръвно налягане
- болки в гърдите поради стенокардия
- бърза или неравномерна сърдечна дейност
- преживели инфаркт като защита срещу евентуален по-нататъшен инфаркт
- предотвратяване на мигрени

Метопролол е за употреба при възрастни.

2. Преди да приемете Метопролол тартарат Акорд

Не приемайте Метопролол тартарат Акорд

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към метопролол или към някоя от останалите съставки на лекарството (вж. точка 6: Допълнителна информация)
- Ако сте алергични към група лекарства, наречени бета-блокери
- Ако имате заболяване, засягащо провеждането на електрическите импулси в сърцето (втора и трета степен сърдечен блок)
- Ако имате тежка сърдечна недостатъчност
- Ако страдате от шок, поради това, че Вашето сърце не изпомпва правилно
- Ако имате много лошо кръвообращение
- Ако имате много бавна сърдечна честота (по-малко от 50 удара в минута)
- Ако приемате група лекарства, наречени бета-агонисти, които се използват в помощ на сърдечната помпа да работи по-силно
- Ако страдате от проблеми със сърдечния ритъм, известни като синдром на болния синусов възел



- Ако имате или сте имали затруднено дишане или астма
- Ако страдате от нелекувано високо кръвно налягане, което се дължи на тумор в близост до бъбрека (феохромоцитом)
- Ако страдате от повишена киселинност на кръвта (метаболическа ацидоза)
- Ако приемате верапамил или дилтиазем чрез интравенозна инжекция
- Ако имате много ниско артериално налягане.

Ако смятате, че някое от тези състояния се отнася до Вас, не приемайте таблетките. Говорете първо с Вашия лекар и следвайте съветите му.

Обърнете специално внимание при употребата на Метопролол тартарат Акорд

Важно е да уведомите Вашия лекар преди да приемете Метопролол тартарат Акорд

- Ако искате да прекратите лечението: не трябва да спирате изведнъж, тъй като това може да влоши хроничната сърдечна недостатъчност и да увеличи риска от сърдечен удар.
- Ако имате проблеми с дишането
- Ако получите алергични реакции, например към ужилване от насекоми, към храни или други вещества
- Ако имате диабет метопролол може да маскира някои симптоми на ниска кръвна захар при диабетици. Може да е необходимо да се коригира и лечението с понижаващи нивото на кръвната захар вещества, които вече получавате.
- Ако имате лошо кръвообращение или сърдечна недостатъчност
- Ако имате бавен сърдечен пулс
- Ако трябва да се подложите на операция, моля, уведомете Вашия анестезиолог, че приемате Метопролол тартарат Акордтаблетки.
- Ако имате сериозни проблеми с черния дроб
- Ако имате тумор в близост до бъбрека (феохромоцитом)
- Ако имате тип гръдна болка, наречена ангина на Принцметал.
- Ако имате хиперфункция на щитовидната жлеза (симптоми като повишена сърдечна честота, изпотяване, тремор, тревожност, повишен апетит или загуба на тегло могат да останат скрити от това лекарство)
- Ако имате или сте страдали от кожни обриви, наречени псориазис
- Ако страдате от сухота в очите
-

Консултирайте се с Вашия лекар, ако едно от предупрежденията споменати по-горе се отнася или се е отнасяло в миналото до Вас.

Прием на други лекарства

Метопролол тартарат Акорд може да повлияе на това как действат някои други лекарства и как други лекарства могат да окажат влияние върху действието на метопролол.

Ако Метопролол тартарат Акорд се комбинира с лекарствата, изброени по-долу, трябва да се консултирате с Вашия лекар:

- Лекарства, използвани за понижаване на кръвното налягане, включително
 - Калциеви антагонисти като например верапамил, нифедипин и дилтиазем
 - Централно действащите агенти като например клонидин, гуанфацин, моксонидин, метилдопа и рилменидин
 - Алфа блокери като например празозин, тамсулозин, теразозин, доксазозин

Ефектите на метопролол и други лекарства, понижавачи кръвното налягане обикновено са адитивни.

- Рифампицин (използван при туберкулоза)
- Лекарство, използвано за лечение на алергии (антихистамини)
- Лекарства, използвани за лечение на депресия (антидепресанти)
- Лекарства, използвани за лечение на тежки психични заболявания (антипсихотици)
- Лекарства, използвани за намаляване на възпалението и високата температура като например целекоксиб, индометацин и флоктафенин.
- Други бета-блокери, подобни на метопролол, включително и тези под формата капки за очи като тимолол.
- Ерготамин (използван при мигрена)
- Нитратите като нитроглицерин (използвани при стенокардия)



- Наркотици като оксикодон (използвани за контрол на силна болка)
 - Дигиталисови гликозиди като дигоксин (използвани при сърдечна недостатъчност).
 - Лекарства, използвани за лечение на нарушен сърдечен ритъм, като пропafenон, амиодарон и хинидин.
 - Атропин (използван за лечение на някои заболявания на очите)
 - Адреналин (използван за спешно лечение на алергични реакции)
 - Анестетици
 - Лекарства, използвани за лечение на диабет
 - Лидокаин (използван за лечение на нарушен сърдечен ритъм)
 - Баклофен (използван за лечение на спастични състояния)
 - Мефлокин (използвани при малария).
- Антиацидни средства (използвани за стомашни разстройства)

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на Метопролол тартарат Акорд с храна и напитки

Трябва да намалите приема на алкохол, когато приемате това лекарство, тъй като то може да увеличи ефекта на метопролол

Бременност и кърмене

Бременност

метопролол тартарат обикновено не се препоръчва по време на бременност, въпреки че Вашият лекар може да реши да използвате метопролол в края на бременността като това се осъществява под строг надзор, включително всички последици за новороденото.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако сте бременна.

Кърмене

Обикновено кърменето трябва да се преустанови по време на лечение с метопролол, въпреки че Вашият лекар може да реши метопролол да се използва от кърмеща майка като новороденото бъде под строго наблюдение. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

метопролол може да повлияе на способността Ви за шофиране и работа с машини, защото той може да предизвика замаяност и умора. Това се отнася в голяма степен за началото на лечението. Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини, ако се появят странични ефекти като умора или замаяност.

3. Как да приемате Метопролол тартарат Акорд

Винаги приемайте Метопролол тартарат Акорд точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Таблетките трябва да се поглъщат на празен стомах.

Обичайната доза е:

- в случай на високо кръвно налягане (хипертония): 100 или 200 mg за предпочитане веднъж дневно като еднократна доза сутрин, или в отделни дози (сутрин и вечер). Вашият лекар може да ви помоли да започнете с по-ниска доза.
- в случай на болка в гърдите (стенокардия): в зависимост от симптомите 100 до 200 mg на ден в разделени дози (сутрин и вечер). Вашият лекар може да ви помоли да започнете с по-ниска доза.
- в случай на нарушен сърдечен ритъм: 100 до 150 mg на ден, в отделни дози (сутрин и вечер). Ако е необходимо, по-нататък Вашият лекар може да увеличи дозата Ви.
- като защита срещу по-нататъшен инфаркт: 100 mg два пъти дневно (сутрин и вечер).
- за предотвратяване на мигрени: 100 до 200 mg на ден, в отделни дози сутрин и вечер.

Това лекарство обикновено се взема дълго време. Никога не променяйте дозата сами.



Дозата може да се намали при пациенти с тежки чернодробни проблеми.

Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Употреба при деца Метопролол тартарат Акорд не се препоръчва за деца.

Ако сте приели повече от необходимата доза Метопролол тартарат Акорд

Симптомите на предозиране включват ниско кръвно налягане, забавен сърдечен пулс, задух, замаяност, умора, кашлица, хрипове, а в тежки случаи, сърдечен арест.

Свържете се незабавно с Вашия лекар. Вземете със себе си празните опаковки на лекарствата, които сте използвали. Понякога, може да се наложи хоспитализация.

Ако сте пропуснали да приемете Метопролол тартарат Акорд

Ако сте пропуснали да вземете една доза, вземете я веднага щом си спомните, освен ако не е почти време за следващата доза.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Метопролол тартарат Акорд

Никога не спирайте внезапно приема на Метопролол тартарат Акорд. Ако внезапно спрете приема на лекарството, Вашето физическо състояние може веднага да се влоши като има вероятност да се развият аномалии в сърдечния ритъм и високо кръвно налягане.

Прекратяването на лечението с метопролол трябва винаги да се извършва след консултация с Вашия лекар, който ще ви насочи как постепенно да намалите дозата, докато лечението бъде спряно напълно.

Ако страдате от проблеми по време на период за постепенно намаляване на дозата, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства Метопролол тартарат Акорд може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете лечението и се свържете с лекар веднага щом получите следните симптоми на:

- алергична реакция като сърбеж, затруднено дишане или подуване на лицето, устните, гърлото или езика.
- много бавно сърце и кръвно налягане (може да почувствате замаяност или слабост) или в случай на затруднено дишане.

Следните термини са използвани, за да се опише колко често страничните ефекти са били докладвани.

много чести: засягат 1 или повече от 1 потребител на 10

чести: засягат 1 до 10 потребители на 100

нечести: засягат 1 до 10 потребители на 1 000

редки: засягат 1 до 10 потребители на 10 000

много редки: засягат по-малко 1 потребител на 10 000

Много чести:

- умора

Чести:

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| • замаяност | • главоболие | • забавена сърдечна честота |
| • ниско кръвно налягане, което може да доведе до припадък или замаяност, особено при бързо изправяне от седнало или легнало положение | • неравномерен сърдечен пулс | • гадене |



- лошо кръвообращение, което води до изтръпване на пръстите на краката и ръцете и блед цвят
- коремна болка
- Недостиг на въздух при усилие
- диария
- запек

Нечести:

- увеличаване на теглото
- депресия
- сънливост
- кошмари
- проблеми със съня
- мускулна слабост
- влошаване на сърдечната недостатъчност
- хрипове
- повишено изпотяване
- и крампи
- задържане на вода
- болка в гърдите
- повръщане
- кожен обрив

Редки:

- нервност
- безпокойство
- трудност или загуба на интерес към секса
- проблеми с очите (замъглено зрение, сухи и/или раздразнени очи, възпаление)
- отклонения в резултатите от кръвните тестове на чернодробната функция
- хрема
- суха уста

- обратим косопад

Много редки:

- силно намаляване на броя на белите кръвни клетки, което прави инфекциите по-вероятни
- намаляване на тромбоцитите в кръвта, което увеличава риска от кръвене или образуване на синини
- нарушение на паметта
- промяна в нивата на мазнините в кръвта
- ниски нива на кръвната захар при диабетици, приемащи инсулин
- личностни промени
- обърканост
- халюцинации
- гангрена
- шум в ушите
- обратим косопад
- свръхчувствителност към светлина
- вкусови нарушения
- възпаление на черния дроб (хепатит)
- необичайно изкривяване на пениса
- влошаване на псориазис
- болки в ставите

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Метопролол тартарат Акорд

- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте Метопролол тартарат Акорд след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонена опаковка след изтичане на срока на годност. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Да се съхранява при температура под 25°C.



- Лекарството не трябва да се изхвърля в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Метопролол тартарат Акорд

Активното вещество е метопрололов тартарат.

Всяка таблетка съдържа 50/100 mg метопролол тартарат .

Другите съставки са:

Микрокристална целулоза (E460); Желатин (E441), Натриев нишестен гликолат, Силициев диоксид, колоиден безводен (E551), Стеаринова киселина

Как изглежда Метопролол тартарат Акорд и какво съдържа опаковката

50 mg таблетки: Бяла до почти бяла около 8 mm кръгла, биконвексна таблетка, маркирана  от едната страна и с делителна черта от другата страна

100 mg таблетки: Бяла до почти бяла, около 10 mm кръгла, биконвексна таблетка, маркирана  от едната страна и с делителна черта от другата страна

Метопролол тартарат Акорд се предлагат в PVC/PVdC- Алуминиеви блистерни опаковки, съдържащи 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84 и 90 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Обединеното Кралство

Производител

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Обединеното Кралство

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните членки на ЕЕО под следните имена:

Страна	Предложено име
България	Метопролол тартарат Акорд 50/100 mg таблетки
Чешка Република	Метопролол тартарат Акорд 50/100 mg tablety
Франция	метопролол tartrat Accord 50/100 mg comprimé
Германия	метопролол tartrat Accord 50/100 mg Tabletten
Италия	метопролол o Accord 100 mg compresse
Полша	Метопролол тартарат Акорд
Румъния	метопролол tartrat Accord 50/100 mg comprimate
Обединеното Кралство	Метопролол тартарат 50/100 mg tablets

Дата на последно одобрение на листовката 11/2012.

