

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Код на вв. № 20011052
Серийния № 33051 / 31-03-2016
Одобрение №

Листовка: информация за потребителя

**ТАНАКАН 40 mg/ml перорален разтвор
TANAKAN 40 mg/ml oral solution**

**Гинко билоба, сух стандартизиран екстракт от листа 40 mg за 1 ml
Ginkgo bilobae folium extractum siccum normatum (EGb 761) 40 mg за 1 ml**

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява ТАНАКАН 40 mg/ml перорален разтвор и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ТАНАКАН 40 mg/ml перорален разтвор
3. Как да приемате ТАНАКАН 40 mg/ml перорален разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТАНАКАН 40 mg/ml перорален разтвор
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ТАНАКАН и за какво се използва

ТАНАКАН 40 mg/ml перорален разтвор се предписва за:

- Симптоматично лечение на болестно нарушение в концентрацията и паметта при възрастни пациенти с изключение на такива с болест на Алцхаймер и други деменции.
- Симптоматично лечение на артериити на долните крайници (болест на артериите на краката предизвикващи болезнени крампи по време на ходене)
- При симптоми свързани с нарушения на зрението и слухово-вестибуларни смущения с предполагаем исхемичен произход.
- При синдрома на Рейно.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ТАНАКАН

Не приемайте ТАНАКАН

Ако сте алергични към гинко билоба екстракт от листа или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Поради наличието на алкохол, информирайте Вашия лекар, в случаите на прекарани или настоящи чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия или ако сте бременна. Приемате други лекарства моля прочетете раздел "Други лекарства и ТАНАКАН". Танакан разтвор съдържа алкохол - моля прочетете "ТАНАКАН съдържа алкохол".

Други лекарства и ТАНАКАН



Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Поради наличието на алкохол, информирайте Вашия лекар, в случаите на прекарани или настоящи чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия. Поради наличието в продукта на етанол (0,45 g за 1 доза) при едновременно прилагане с определени лекарства е възможна проявата на т.нар. "дисулфирам реакция", която се дължи на непълно разграждане на алкохола и протича със симптоми на топли вълни, зачервяване, чувство за топлина, повръщане, повишен сърдечен пулс и др. (моля вижте " **ТАНАКАН съдържа алкохол** ").

Поради фармакодинамичен антагонизъм и също поради наличието на етанол, продуктът не трябва да се употребява с лекарства, потискащи централната нервна система.

ТАНАКАН с храна и напитки

ТАНАКАН се приема по време на хранене.

Бременност и кърмене

Трябва да избягвате да приемате ТАНАКАН, ако сте бременна или кърмите.

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна, планирате бременност или кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Някои хора могат да почувстват замаяност след използването на ТАНАКАН. Ако това Ви се случи, не шофирайте и не използвайте машини.

ТАНАКАН съдържа алкохол

Този лекарствен продукт съдържа 57 об.% етанол (алкохол), т.е. 0,45 g алкохол в една доза (1 ml), което съответства на 11,3 ml бира или 4,7 ml вино.

Вреден за хора, страдащи от алкохолизъм.

Да се има предвид при бременни и кърмачки, деца и рискови групи, като пациенти с бъбречно заболяване или епилепсия.

Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате депресанти на централната нервна система или лекарства, които биха могли да взаимодействат с алкохол (дисулфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксеф, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид, гризеофулвин, метронидазол, орнидазол, секнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин).
Моля имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

3. Как да приемате ТАНАКАН

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Примерете една доза (1 доза = 1 ml разтвор за пиене) с помощта на дозиращо устройство.

Препоръчителната доза е:

3 дози (3 ml) дневно, разпределени през деня.

Дозите трябва да се разреждат в половин чаша вода и да се приемат по време на хранене.

Танакан трябва да се използва само от възрастни.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Резюме на профила на безопасност

Най-честите нежелани реакции са: коремна болка, диария и виене на свят.

Ако получите тежка алергична реакция (ангиоедем), която причинява подуване на лицето, устните, езика или гърлото, спрете незабавно приема на това лекарство и потърсете спешна медицинска помощ.

Други възможни нежелани реакции:

- Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

- алергична реакция;
- затруднено дишане;
- главоболие;
- припадък;
- лошо храносмилане;
- гадене;
- екзема;
- сърбеж.

- Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- копривна треска;
- обрив.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София,

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ТАНАКАН

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и етикета на флакона след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте повече от 3 месеца, след първото отваряне на флакона.

Не използвайте това лекарство, ако забележите следи от отваряне на флакона с разтвора.



Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ТАНАКАН

- Активното вещество е Гинко билоба, сух стандартизиран екстракт от листа
- Другите съставки са: етанол 0,45 g за 1 ml, захарин натрий, портокалова есенция, лимонова есенция, етанол, пречистена вода.

Как изглежда ТАНАКАН и какво съдържа опаковката

Кафява стъклена бутилка тип III, с PE – капачка на винт и PE – дозиращо устройство от 1 ml, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

IPSEN PHARMA
65, quai Georges Gorse
92100, Boulogne Billancourt
ФРАНЦИЯ

Производител

Beufour Ipsen Industrie
Rue d'Ette Virton, 28100 Dreux,
Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката: 09/2013

