

## **Листовка за пациента**

### ***Motilium lingual***

### **Мотилиум лингвал**

#### **Таблетки**

## **КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОТИЛИУМ ЛИНГВАЛ?**

Мотилиум е лекарство, което кара храната да се движи по-бързо по хода на хранопровода, стомаха и червата, като предотвратява застояването ѝ на едно място и придвижването и в обратна посока. Активното вещество в Мотилиум лингвал е домперидон.

**Таблетките Мотилиум лингвал са бели кръгли таблетки.**

Една лингвална таблетка съдържа 10 мг домперидон.

Лингвалните таблетки съдържат още желатин, манитол, аспартамат, ментов аромат и полаксамер 188.

## **ЗА КАКВО СЕ УПОТРЕБЯВА МОТИЛИУМ ЛИНГВАЛ?**

Мотилиум лингвал се прилага при:

- дискомфорт, свързан с бавно изпразване на стомашното съдържимо,
- гадене и повръщане.

## **КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА МОТИЛИУМ?**

Не трябва да употребявате Мотилиум в случай че:

- имате данни за свръхчувствителност към него.
- страдате от заболяване на хипофизната жлеза, известно като пролактином.

При нужда, обърнете се за съвет към своя лекар.

- В случай, че имате силни свиващи болки в стомаха или изпразненията Ви са оцветени в черно.

При наличието на което и да е от тези оплаквания, обърнете се към своя лекар.

## **КАКВИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕТЕ?**

### **Деца под 5 години и кърмачета**

Лингвалните таблетки не са подходящи за тази възрастова група.

### **Бременност**

Ако сте бременна или считате, че сте бременна, трябва да съобщите това на своя лекар, който ще прецени бихте ли могли да приемате Мотилиум лингвал или не.

### **Кърмене**

Малки количества Мотилиум лингвал могат да се отделят в майчиното мляко. Ако кърмите, трябва да се посъветвате с лекар. За предпочитане е кърмещите жени да избягват приема на Мотилиум.

### **Чернодробни и бъбречни заболявания**

Ако страдате от заболяване на бъбреците или черния дроб, трябва да съобщите за него на своя лекар. Ако приемате Мотилиум лингвал за по-дълъг период от време Вашият лекар ще коригира дозировката на лекарството.

### **Взаимодействия с други лекарства**

- В случай че приемате медикаменти, които забавят стомашната и чревна моторика (напр. антихолинергични средства), уведомете своя лекар за това, тъй като те може да влязат във взаимодействие с Мотилиум лингвал.

- Трябва да информирате своя лекар и в случай че приемате лекарства, повлияващи стомашната киселинност. Те могат да се комбинират с Мотилиум лингвал.

Независимо от това, не трябва да приемате Мотилиум лингвал едновременно с другите лекарства, понеже това би могло да намали техния ефект. Поради това трябва да приемате Мотилиум лингвал преди хранене, а лекарството за лечение на стомашното заболяване след хранене.

-Винаги, когато приемате други лекарства, съобщавайте за това на своя лекар.

### **Способност за шофиране и работа с машини**

Няма ограничения, тъй като Мотилиум лингвал не повлиява вниманието.

### **КАК ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА МОТИЛИУМ И В КАКВА ДОЗИРОВКА**

Мотилиум лингвал проявява най-голям ефект, ако се приема 15-30 минути преди хранене и ако е необходимо — вечер преди лягане.

Мотилиум лингвал представляват бързо -разтворими таблетки: поставете ги върху езика си и те ще се стопят за няколко секунди.

Ето защо не е необходимо да ги приемате с вода.

### **Изваждане на таблетката от блистера:**

**НЕ ВАДЕТЕ** таблетката през фолиото.

Това може да я повреди, защото таблетките са лесно чупливи.

Издърпайте края на фолиото и го обелете напълно.

Извадете таблетката.

Вземете и поставете таблетката върху езика и тя ще си стои за секунди.

### **ВЪЗРАСТНИ**

1 таблетка 3-4 пъти дневно.

В случай, че тази дозировка не доведе до желания резултат или чувствате гадене или имате позиви за повръщане, може да се удвои дозата на лекарството.

Изброените дозировки са най-често употребявани, но Вашият лекар може да ги промени, в зависимост от индивидуалните Ви нужди.

## **ДЕЦА**

### **Под 5 години:**

Мотилиум лингвал не е подходящ за деца под 5 години.

### **5-12 години:**

1 таблетка 3 пъти дневно преди хранене; ако тази дозировка не е достатъчна може да се приеме и още една таблетка вечер преди сън.

### **Над 12 години:**

Дозировката е както при възрастни.

## **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

- Могат да се появят много слаби стомашни спазми, но те бързо изчезват след намаление на дневната доза или прекратяване приема на лекарството.
- Много рядко могат да се наблюдават неконтролирани движения като потрепвания на очите, принудителни положения, като изкривяване на шията, мускулен тремор или ригидност, но те изчезват без последствия скоро след прекъсване приема на Мотилиум лингвал. Ако подобни симптоми се появят, обърнете се към лекар.
- При някои лица се наблюдава подуване на гърдите или изтичане на млечен секрет. Тези симптоми са безобидни, но е необходимо да уведомите своя лекар.
- Свръхчувствителността към Мотилиум лингвал се среща рядко. Тя се изразява в кожен обрив, сърбеж, поява на задух или оток на лицето. При появата на такива признаци, прекратете лечението с Мотилиум лингвал и се обърнете към своя лекар.

Без колебание съобщавайте на Вашия лекар за появата на каквито и да е други нежелани лекарствени реакции.

## **ПРЕДОЗИРАНЕ**

В случай, че приемете твърде голямо количество Мотилиум лингвал, настъпват оплаквания като сънливост, объркване, неконтролирани движения, като очни потрепвания или принудителна поза, напр. изкривяване на шията. Тези симптоми обикновено остават без последствия; независимо от това и особено в случай, че медикаментът е погълнат от дете, трябва да се обърнете за помощ към лекар незабавно.

При предозиране можете да приемете активен въглен, който абсорбира медикамента, намиращ се в стомаха.

### ***Информация за лекаря в случай на предозиране***

- При случаи на предозиране се препоръчва приемането на активен въглен и строг лекарски контрол.
- За потискане на екстрапирамидната симптоматика се прилагат антихолинергични антипаркинсонови средства или антихистаминови препарати с антихолинергични свойства.

## КАК ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА МОТИЛИУМ ЛИНГВАЛ?

Съхранявайте Мотилиум лингвал при температура до 30 °C (т.е. при нормална стайна температура). На сухо място.

Медикаментът може да се съхранява за ограничен период от време. Не употребявайте Мотилиум лингвал след изтичане на срока на годност (датата - месец и година), отбелязан с "Ехр.", дори ако е бил съхраняван правилно. Съветваме Ви да връщате всички медикаменти с изтекъл срок на годност на своя фармацевт.

Произведен и регистриран от:

JANSSEN

PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse, Белгия

Последна редакция на текста: февруари 1996 г.

### *Какво трябва да знаете за лекарствените средства...*

*В случай, че приемате други лекарства, винаги информирайте Вашия лекар или фармацевт, тъй като някои медикаменти не трябва да се употребяват едновременно.*

*Лекарствените средства са много добре изпитани преди даването им на пациентите. По тази причина е малко вероятно да възникне нещо нередно в случай, че лекарствените средства са използвани правилно, т.е. както следва:*

- единствено за целта, за която е даден медикаментът;*
- само в предписаното количество;*
- само за предписания период от време.*

*Съхранявайте всички лекарства на недостъпно за деца място.*

*Никога не позволявайте на други да използват предписаното на Вас лекарство и никога не приемайте медикаменти предписани за други пациенти.*

*Съхранявайте всички лекарства в оригиналната им опаковка и на сухо място (напр. никога в банята).*

*В случай, че някой е приел свръхдоза от медикамента, обадете се на Вашия лекар или на Центъра за Бърза медицинска помощ тел.: 150.*