

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
Атенолол-Чайкафарма 50 mg таблетки
Atenolol-Tchaikapharma 50 mg tablets
(Атенолол/Atenolol)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: 11-3840	19.12.08
Одобрено: 26 / 11.11.08	

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Пазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Запомнете – това лекарство е изписано само за Вас!

В тази листовка:

1. Какво представлява Атенолол-Чайкафарма и за какво се използва
2. Преди да приемете Атенолол-Чайкафарма
3. Как да приемате Атенолол-Чайкафарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Атенолол-Чайкафарма
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АТЕНОЛОЛ-ЧАЙКАФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Името на Вашето лекарство е Атенолол-Чайкафарма. Неговата активна съставка се нарича атенолол. Във всяка таблетка се съдържат 50 mg атенолол.

Атенолол-Чайкафарма принадлежи към групата лекарства, наречени бета-блокери. Това означава, че той въздейства върху Вашето сърце и кръвообращение. Атенолол-Чайкафарма се използва за лечение на повишено кръвно налягане, исхемична болест на сърцето (стенокардия и миокарден инфаркт, причинени от атеросклеротични промени и смущения на сърдечния ритъм). Атенолол предпазва сърцето от прекалено натоварване и понижава повишеното кръвно налягане.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ АТЕНОЛОЛ-ЧАЙКАФАРМА

Не приемайте Атенолол-Чайкафарма ако имате или сте имали:

- свръхчувствителност към атенолол или към някое от помощните вещества, влизащи в състава на таблетките;
- сърдечни проблеми, включително декомпенсирана сърдечна недостатъчност или сърдечен блок втора или трета степен, много бавен или много непостоянен сърдечен ритъм, много ниско кръвно налягане или лошо кръвообращение;

- феохромоцитом (високо кръвно налягане, причинено от тумор, най-често близо до бъбреците), който не е бил лекуван. Ако Вие сте лекувани за феохромоцитом, Вашият лекар ще Ви даде друго лекарство, наречено алфа-блокатор, което да приемате заедно с Атенолол-Чайкафарма;
- метаболитна ацидоза: прекалено количество киселина в кръвта в резултат на нарушения в метаболизма.

Обърнете специално внимание при употребата на Атенолол-Чайкафарма

Преди да започнете лечението с Атенолол-Чайкафарма, информирайте Вашия лекар:


- Ако имате астма или алергични реакции, напр. към ужилвания от насекоми. Ако сте имали астма или хрипове, не трябва да взимате тези таблетки без да обсъдите тези симптоми с лекаря, който пръв Ви изписва таблетките.
- Ако страдате от алергични реакции (докато приемате лекарството си) като уртикария, оток на кожата и оток около устата, то се нуждаете от спешен медицински преглед.
- Ако страдате от специфични болки в гърдите (ангина), наричана ангина на Принцметал.
- Ако имате лошо кръвообращение, компенсирана сърдечна недостатъчност или сърдечен блок първа степен.
- Ако имате диабет, атенолол може да маскира симптомите на изключително ниското съдържание на захар в кръвта (хипогликемия). Тези симптоми няма да бъдат забелязани или ще се проявят съвсем слабо, когато е прекалено късно да се овладеят.
- При съмнение за тиреотоксикоза (свърхактивност на щитовидната жлеза), тъй като атенолол може да маскира симптомите на това заболяване.
- Ако сте в напреднала възраст или имате нарушения във функциите на бъбреците
- Ако сте бременна или кърмите
- Ако вземате никакви други лекарства. Атенолол-Чайкафарма може да повлияе начина на действие на някои лекарства, а други лекарства могат да повлияят ефекта на Атенолол-Чайкафарма.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта, като:

- Клонидин (за високо кръвно налягане или за мигрена). Ако го приемате едновременно с Атенолол-Чайкафарма, не спирайте да взимате клонидин, без да се консултирате с Вашия лекар. Ако е необходимо да спрете клонидин, Вашият лекар ще Ви даде точни инструкции как да го направите.
- Верапамил, дилтиазем, нифедипин (лекарства за високо кръвно налягане или гръдна жаба)
- Дизопирамид или хинидин (за неритмичен пулс)
- Дигоксин (за сърдечна недостатъчност)
- Адреналин
- Ибупрофен и индометацин (за болка и възпаление)
- Инсулин и перорални противодиабетни лекарства
- Назални деконгестанти или други лекарства срещу настинка (включително тези, които си купувате без рецепта в аптеката)

Ако вземате никакви други лекарства, включително такива, които сте си купили сами от аптеката, информирайте лекаря си.



Може да забележите забавяне на пулса, когато вземате таблетките. Това е нормално, но ако сте обезпокоени, моля свържете се с лекаря си.

Ако постъпите в болница, уведомете медицинския персонал и най-вече анестезиолога, че вземате Атенолол-Чайкафарма.

Бременност и кърмене

Употребата на Атенолол-Чайкафарма по време на бременност и кърмене не се препоръчва, освен ако Вашият лекар не прецени, че ползата за майката надвишава потенциалния риск за плода и новороденото.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство по време на бременност или кърмене!

Шофиране и работа с машини

По време на лечението с Атенолол-Чайкафарма могат да се появят замаяност или умора, което трябва да се има предвид при шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Атенолол-Чайкафарма

В състава на Атенолол-Чайкафарма се съдържа натрий, който може да представлява опасност за пациенти на хипонатриемична диета.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АТЕНОЛОЛ-ЧАЙКАФАРМА

Винаги приемайте Атенолол-Чайкафарма таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Приемайте таблетките с половин чаша вода.

Обичайни дози при възрастни

Високо кръвно налягане	50 mg до 100 mg
Болки в гърдите (гърдна жаба)	100 mg веднъж дневно или 50 mg два пъти дневно
Неритмична сърдечна дейност	50 mg до 100 mg
Ранно лечение на миокарден инфаркт	50 mg до 100 mg

Ако сте приели повече от необходимата доза Атенолол-Чайкафарма
Ако са приети повече от необходимите таблетки Атенолол-Чайкафарма, обърнете се незабавно към лекар. Запазете опаковката, за да знае лекарят кое е лекарството.

Предозирането се проявява със силно забавен пулс, изключително понижаване на кръвното налягане, пристъп на астма и слабост на сърцето (което се изразява със симптомите на силна умора и стягане в гърдния кош).

Ако сте пропуснали да приемете Атенолол-Чайкафарма

Ако пропуснете прием, вземете дозата възможно най-скоро, освен ако не е време за следващия прием. В този случай не вземайте пропуснатата доза, а се върнете към предписания Ви дозов режим. Никога не удвоявайте дозите. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели приема на Атенолол-Чайкафарма

Не спирайте лечението, освен ако това не Ви е предписано от Вашия лекар. Важно е да продължите да взимате Атенолол-Чайкафарма толкова продължително, колкото е предписал Вашия лекар. Внезапното спиране на употребата на Атенолол-Чайкафарма може да доведе до повишаване на кръвното налягане и смущения в сърдечния ритъм. Никога не решавайте да спрете приема на тези таблетки сами- винаги първо се консултирайте с Вашия лекар. Обикновено вашият лекар първо ще намали постепенно дозата на Атенолол-Чайкафарма или ще го замени с друго лекарство.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Атенолол-Чайкафарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Като цяло атенолол е с добра поносимост. Честотата на възможните нежелани реакции е дефинирана като: много чести ($\geq 1/10$), чести ($\geq 1/100$, $<1/10$), нечести ($\geq 1/1000$, $<1/100$), редки ($\geq 1/10000$, $<1/1000$), много редки ($<1/10000$), включително и изолирани случаи.

Сърдечни нарушения

- **Чести:** забавена сърдечна дейност (брадикардия), понижено кръвно налягане (хипотония)
- **Редки:** влошаване на съществуваща сърдечна недостатъчност, нарушения на нормалното функциониране на сърцето

Нарушения на кръвта и лимфната система

- **Редки:** възпаление на малките кръвоносни съдове (пурпура), понижен брой тромбоцити (тромбоцитопения)

Нарушения на нервната система

- **Нечести:** смущения в съня
- **Редки:** изтръпване в крайниците (парестезия), главоболие, халюцинации, психози, объркване, замаяност, депресия, кошмари, промени в настроението.

Нарушения на очите

- **Редки:** нарушения в зрението, сухота в очите

Стомашно-чревни нарушения


- **Чести:** стомашно-чревни оплаквания, гадене, повръщане, диария
- **Редки:** сухота в устата

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

- **Редки:** бронхиални спазми при пациенти с бронхиална астма или с история за астматични оплаквания

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

- **Редки:** плешивост (алопеция), обостряне на псориазиса, кожни обриви
- **Неизвестни:** реакции на свръхчувствителност, включително алергична реакция от съдов произход (ангиоедем) и копривна треска (уртикария).



Съдови нарушения

- Чести: студени пръсти на крайниците
- Редки: ортостатична хипотония, която може да бъде свързана със синкоп, симптоми тип Рейно, влошаване на съществуващо интермитиращо накуцване

Хепато-билиарни нарушения

- Нечести: повишение на определени чернодробни ензими (трансаминази)
- Редки: увреждане на черния дроб

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

- Редки: импотентност

Общи нарушения

- Чести: умора

Лабораторни тестове

- Много редки: наблюдавано е повишаване на определени антитела в кръвта (анти-нуклеарни антитела), чието клиничното значение не е ясно.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Ако след прочитането на тази листовка все още имате някакви въпроси или не сте достатъчно сигурни за нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, които разполагат с много по-подробна информация за този лекарствен продукт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА АТЕНОЛОЛ-ЧАЙКАФАРМА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте таблетките при температура под 25 ° C, на сухо място.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не употребявайте таблетките след изтичане на срока на годност, обозначен върху външната опаковка.

Не използвайте Атенолол-Чайкафарма ако забележите промяна в цвета или вида на таблетките.


Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Атенолол-Чайкафарма

- Активната съставка е атенолол.
- Освен това Атенолол-Чайкафарма обвити таблетки съдържат следните неактивни съставки: магнезиев карбонат, царевично нишесте, желатин, магнезиев стеарат и натриев лаурилсулфат.

Как изглежда Атенолол-Чайкафарма и какво съдържа опаковката



Атенолол-Чайкафарма се предлага в картонени кутии, съдържащи три алуминиеви блистера, всеки от които с десет таблетки.

Притежател на разрешението за употреба
"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД
гр. София 1172, бул. "Г.М.Димитров" № 1, България

Производител
"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД
бул. "Н.Вапцаров" № 1, гр. Варна 9000, България

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба:

"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД
1172 София, бул. "Г.М.Димитров" №1
тел. 02 / 962 54 54
факс: 02/ 960 37 03
e-mail: info@tchaikapharma.com

Дата на последно одобрение на листовката
Ноември 2008 г.

