Листовка: информация за потребителя

Дипросалик 0,5 mg/g + 20 mg/g дермален разтвор
бетаметазон/салицилова киселина

Diprosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g cutaneous solution
betamethasone/salicylic acid

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Дипросалик и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дипросалик
3. Как да използвате Дипросалик
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дипросалик
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 20000523
Разрешение № BG/MA/MP-55819
Одобрение № / 27. 08. 2021

1. Какво представлява Дипросалик и за какво се използва

Дипросалик дермален разтвор съдържа две активни съставки: бетаметазон (под формата на дипропионат) и салицилова киселина. Бетаметазонът е локален кортикостероид и спада към групата на мощните кортикостероиди. Този вид лекарства се прилагат върху кожата, за да намалят червенината и сърбежа, причинени от различни кожни заболявания. Салициловата киселина омекотява сухите люспести образувания по кожата, причинени от кожното заболяване и така позволява на бетаметазона да достигне подлежащата болна кожа и да спомогне за нейното излекуване.
Дипросалик дермален разтвор се използва при възрастни и деца за облекчаване на възпаление, сухота, сърбеж и дискомфорт, които могат да настъпят при псориазис, себорея, екзема, дерматит и други заболявания на скалпа и кожата, които се повлияват от лечение с кортикостероиди.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дипросалик

Не използвайте Дипросалик дермален разтвор
- ако сте алергични към бетаметазон, салицилова киселина или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- при други кожни заболявания, защото състоянието може да се влоши, особено при случаи на розацея (заболяване на кожата, което засяга лицето), акне, периорален дерматит (възпаление на кожата около устата), сърбежи в областта на гениталиите, обриви под бебешки пелени, херпеси, варицела, и други вирусни кожни заболявания.

Свържете се с Вашия лекар, ако имате замъглено зрение или други зрителни смущения.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

3. Как да използвате Дипросалик

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза при деца и възрастни е няколко капки Дипросалик дермален разтвор, които два пъти дневно (сутрин и вечер) се втриват леко в засегнатите участъци от кожата на главата до пълно попиване на лекарството.
Не използвайте за никакви други болести на скалпа и кожата.
Не използвайте върху големи участъци от тялото, тъй като това може да увеличи абсорбираното количество.
При деца не прилагайте за период, по-дълъг от 5 дни.
Не използвайте големи количества от дермалния разтвор за продължителен период от време (например всеки ден в продължение на седмици или месеци).
Избягвайте контакт с очите.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Дипросалик
Ако Вие (или някой друг) погълнете от дермалния разтвор, това не би трябвало да предизвика проблем. Все пак, ако сте разтревожени, посъветвайте се с Вашия лекар. Ако използвате дермалния разтвор по-често, отколкото трябва, това може да окажа влияние върху някои хормони; при деца може да повлияе растежа и развитието им. Съобщете на Вашия лекар, ако не сте използвали дермалния разтвор както Ви е бил предписан или сте го използвали прекалено често и/или продължително време.

Ако сте пропуснали да използвате Дипросалик
Ако забравите да приложите дермалния разтвор, направете го веднага щом се сетите и продължете с обичайната схема на приложение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
При повечето хора, когато се прилага правилно, Дипросалик не предизвиква никакви проблеми. Все пак, ако използвате дермалния разтвор по-често, отколкото е необходимо, това може да доведе до изтъняване на кожата и да забележите по нея червени петна. Това може да се случи по-лесно при бебета и деца. Освен това, дермалният разтвор може да причини друго кожно заболяване, наречено дерматит – състояние, провокирано от реакцията на кожата към външни агенти, напр. препарати за миене, които предизвикват зачервявания на кожата и сърбежи, както и зрителни нарушения, като замъглено зрение. Ако тези или други нежелани реакции Ви тревожат, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ *

реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Дипросалик

Да се съхранява под 25°C.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 6 седмици.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Дипросалик

- Активните вещества са: бетаметазон 0,5 mg/g (под формата на дипропионат 0,64 mg/g) и салицилова киселина 20 mg/g.
- Другите съставки са: динатриев едетат, хидроксипропил метилцелулоза, натриев хидроксид, изопропилов алкохол и пречистена вода.

Как изглежда Дипросалик и какво съдържа опаковката
Дипросалик дермален разтвор е безцветен, леко гъст разтвор. Доставя се в бутилки от 30 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на Разрешението за употреба
N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Нидерландия

Производител
Cenexi HSC,
Hérouville Saint-Clair
Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България
Органон (И.А.) Б.В. -клон България
Тел.: +359 2 806 3030
info.bulgaria@organon.com

Дата на последно преразглеждане на листовката:

