

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТРОКСЕВАЗИН 2% гел

TROXEVASIN 2% гел

троксерутин (troxerutin)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Към Рег. №

26020356

Разрешение №

1-18281

12 06, 2012

Одобрение №

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 6-7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

В тази листовка:

1. Какво представлява Троксевазин и за какво се използва
2. Преди да използвате Троксевазин
3. Как да използвате Троксевазин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Троксевазин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Троксевазин и за какво се използва

Активното вещество в лекарствения продукт Троксевазин е троксерутин. Троксерутин укрепва стените на кръвоносните съдове (капилярите). Използва се за облекчаване на отока и свързаните с хроничната венозна недостатъчност симптоми (умора, тежест, подуване, болки и схващане, изтръпване и мравучкане на краката, при болка след склеротерапия или продължително пътуване), както и за облекчаване на болка и оток от травматичен произход като изкълчване или мускулна контузия.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Троксевазин

Не използвайте Троксевазин

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на Троксевазин, изброени в точка 6.

Предупреждения и предпазни мерки

Троксевазин гел не трябва да се нанася върху лигавици, открити рани и екземи.

Други лекарства и Троксевазин

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Няма данни за лекарствени взаимодействия.

Троксевазин с храна, напитки и алкохол

Няма ограничения относно приложението на продукта и приема на храни и напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет



Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Няма данни за нежелани ефекти върху плода и новороденото при използване на продукта.

Шофиране и работа с машини

Не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Троксевазин съдържа бензалкониев хлорид

Бензалкониевият хлорид е дразнещо вещество и може да причини кожни реакции.

3. Как да използвате Троксевазин

Винаги използвайте Троксевазин точно както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Прилага се външно, два пъти дневно. Гелът се втрива с леки, масажирани движения до пълно резорбиране. При необходимост може да се прилага и под стегната или еластична превръзка. При по-тежки случаи се препоръчва комбинирана терапия с Троксевазин капсули.

Ако сте приели повече от необходимата доза Троксевазин

При случайно поглъщане на големи количества е необходимо да се приложат общи мерки за извеждане от организма (средства, предизвикващи повръщане) и се прилага симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да използвате Троксевазин

Ако сте пропуснали намазване, приложете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

След прилагане на Троксевазин гел много рядко се наблюдават реакции на кожно дразнене - зачервяване, сърбеж, кожни обриви. Те преминават бързо след прекъсване на лечението.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Троксевазин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

При температура под 25°C. Да не се замразява!

Не използвайте Троксевазин след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 6 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



б. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

- Активното вещество в 1 g гел е троксерутин (troxerutin) 20 mg.
- Другите съставки са: карбомер, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, троламин, пречистена вода.

Как изглежда Троксевазин и какво съдържа опаковката

Жълта или блеодокафява еднородна гелна маса.

По 40 g Троксевазин 2% гел в алуминиева или ламинатна мембранна туба, в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

"Актавис" ЕАД

ул. "Атанас Дуков" № 29

1407 София, България

Производител

"Балканфарма Троян" АД,

ул. "Крайречна" №1,

5600 Троян, България

Tel. +(359 670) 62 607

Дата на последно преразглеждане на листовката: септември 2011 г.

